

○ 新品種3題 (水島正美) Masami MIZUSHIMA: On three new forms of Japanese plants.

ウラジロフサザクラ (新称) 東北地方南部以西の各地溪間に多産するフサザクラの常形は、葉の表面が深緑色で光沢があり、裏面が淡緑色で殆ど無沢である。これに対し、葉裏に明かな白霜を帯びる変形を岐阜県益田郡小坂町落合の附近で見出した。同地は木曾御嶽の飛驒口登山路の一合目に当り、採集箇所は日当りの良い礫地で、常形に混じて1株だけあつた。尚、中間形は見当らなかつた。これを新品種と認めて上記の和名を与え、次の如く記載する。

Euptelea polyandra Sieb. et Zucc. f. **hypoleuca** Mizushima et Yokouchi, f. nov.

Foliis supra viridibus lucidis, subtus glaucis e typo cum foliis subtus dilute viridibus differt.

Hab. Honshu: in open sunny situation at the foot of Mt. Ontake, Ochiai, Osaka-machi, Masuda-gun, Prov. Hida (Aug. 18, 1954, M. Mizushima & I. Yokouchi)—holotype in TI.

シロバナタテヤマウツボ (新称) 花と共に茎や葉にも重色を帯びることが多いタテヤマウツボグサの白花品があり、長野県北安曇郡北城村内の八方山の産にかかり、東京薬科大学生薬学教室の鈴木健氏の採集による。白花形の常として全株稍々淡い緑色である。常品との中間形としてピンク色の花を着けるものが記載されているから、ウツボグサやキラソソウに認められるのと同様な花色変異が確認されたことになる。上記の和称を附して次の如く記載する。

Prunella prunelliformis Mak. forma **albiflora** Mizushima, f. nov.

Planta purpureo non suffusa, flores candida.

Hab. Honshu: on sunny, rocky, west-facing slope of Mt. Happō, at about 1800 m in elevation, Kitashiro-mura, Kita-azumi-gun, Prov. Shinano (Aug. 19, 1955, Tsuyoshi Suzuki)—holotype in TI.

シロバナオニシオガマ (新称) 北陸、東北地方の湿原の縁などに産するオニシオガマは通常淡紅紫花を着け、花茎や葉柄等に少しは紫味を帯びている。ところが長野県下水内郡水内村の野々海湿原に、全体淡緑で紫采なく、白花の一形が見出された。これに上の新和名を命じ、次の如く記載する。尚、原産地は貯水池と化してしまい、他に稀種も産した所であるが、皆水没の悲運を見るに至つた。

Pedclais nipponica Mak. forma **alba** Mizushima et Yokouchi, f. nov.

Planta toto dilutior colorata, bracteis pallide viridibus et purpureo destitutis, floribus albis e typo abhorret.

Hab. Honshu: Nonomi moor, Minochi-mura, Shimo-minochi-gun, Prov. Shinano (Sept. 15, 1954, I. Yokouchi)—holotype in TI.

(資源科学研究所)